

予防接種の記録(1)

インフルエンザ菌b型 (Hib)	1回	4w	推奨: 開始(初回)が生後2カ月～6カ月 2カ月になる日の前日～6カ月(7カ月になる日の前日)に初回=total 4回
	2回		
	3回	4w	7か月以上(～13か月まで)
	追加	※1歳ごろ	
小児肺炎球菌	1回	4w	推奨: 開始(初回)生後2カ月～6カ月 2カ月になる日の前日～6カ月(7カ月になる日の前日)に初回=total 4回
	2回		
	3回	4w	60日以上あけて
	追加	※1歳以降	
B型肝炎	1回	139日以上 (20w)	推奨: 2カ月～8カ月 無料: 1歳誕生日の前日まで 27日以上(4w)
	2回		
	3回		

★ 1歳お誕生日おめでとう! 「ヒブ・肺炎球菌・MR・水痘・おたふく」

★ 年長さんおめでとう! MR・おたふく・不活化ポリオ(不活化ポリオは任意8,000円)

<予防接種の後の注意点>

- ※ ロタウイルス、BCG、ガーダシルはそれぞれの規定時間を接種後院内で様子観察をする
- ※ その他のワクチンは、接種後すぐに帰宅してよい
- ※ 1時間安静に様子を見て、体調に変化が慣れれば普段通りの生活でよい
- ※ 日頃行っているスポーツであれば、体調に問題なければ行ってもよい
- ※ 体調に問題がなければ、接種後1時間後からお風呂・シャワーも入ってもよい

予防接種の記録(2)

		ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ(4種混合)	
第1期 初回	1回	20日以上	推奨: 3カ月になる日の前日～18カ月
	2回		
	3回		
第1期 追加		(6ヶ月以上)	標準1年(6ヶ月～1年半)あけて

BCG 生	推奨: 5～7カ月
	無料: 1歳誕生日前日まで <接種前日の注意> 左上腕部にステロイド剤は塗らない <接種当日の注意> 完全に乾くまで院内で待つ 接種直後髪や服が当たらないように注意 当日の直射日光× 入浴時こすらない ステロイド2～3か月塗らない コッホ現象に注意

麻疹 風疹 生	第1期	1歳誕生日前日～2歳誕生日前日
	第2期	年長 無料: 特別接種制度あり ※申請書類提出必要

水痘 生	1回	推奨: 1歳～1歳3か月 無料: 1歳誕生日前日～3歳誕生日前日
	2回	

予防接種の記録(3)

日本脳炎		
第1回	1回	推奨: 3歳~4歳BD前日 無料: 1期 6カ月~7歳5カ月
初回	2回	6~28日
第一期追加	6ヶ月~標準1年	海外渡航時など 推: 4歳~5歳前日 3歳未満は0.25ml

子宮頸がん予防ワクチン ヒトパピローマウイルス (2価・4価)		無料: 小6~高1
1回	1回目: 30分院内待機 2ヶ月以上あけて	
2回	2回目: 15分院内待機 6ヶ月以上あけて (6ヶ月後の同一日)	
3回	3回目: 15分院内待機	

予防接種の記録(4)

ジフテリア 破傷風	第2期	推奨: 11歳~12歳誕生日前日 無料: 11歳誕生日の前日~13歳誕生日前日
日本脳炎	第2期	推奨: 9歳~10歳誕生日前日 無料: 9歳誕生日の前日~13歳誕生日前日

1価ロタリックス 1.5ml	1回	4w 推奨: 生後2ヶ月~ 無料: 生後6w0d~24w0d
	2回	
ロタウイルス 経口摂取	生	10分間院内待機
5価ロタテック 2.0ml	1回	4w 推奨: 生後2ヶ月~ 無料: 生後6w0d~32w0d
	2回	
	3回	
おたふくかぜ	1回	推奨: 1歳誕生日当日~2歳誕生日前日
生	2回	推奨: 年長 八王子市補助あり 自己負担3,000円
インフルエンザ	6カ月~接種可能	
	3歳未満	0.25ml × 2
	3歳~12歳	0.5ml × 2
	13歳~	0.5ml × 1
		2~4wあける

不活化ポリオ	年長でMRと共に接種する人が多い
--------	------------------