

## 予防接種の記録(3)

日本脳炎		
第1期	1回	推奨:3歳~4歳BD前日 無料:1期 6カ月~7歳5カ月
初回	2回	6~28日
第一期追加	標準1年	海外渡航時など
		推奨:4歳~5歳前日 3歳未満は0.25ml

ガーダシル		
(4価)	1回	①30分待機 無料:小6~高1
ヒトパピローマウイルス	2回	②15分待機 2ヶ月以上あけて
※シルガード9	3回	③15分待機 6ヶ月以上あけて (6ヶ月後の同一日) 2回接種者は間隔下記参照
(9価)		

### ※シルガード9(9価) 2回または3回

#### ア. 2回の場合(15歳未満のみ実施可能)

1回目を15歳の誕生日前日までに接種することで、2回の接種で完了することができる(被接種者の希望で3回接種も可能)

標準的な接種方法として1回目から6~12カ月の間隔を置いて1回行う

**※1回目を「15歳の誕生日当日」に接種した場合は3回接種**

#### イ. 3回の場合

標準的な接種方法として、2カ月の間隔を置いて2回行った後、1回目の接種から6ヶ月の間隔を置いて1回行う

※1年以内に3回の接種を完了することが望ましい

### 子宮頸がん予防ワクチンの定期接種対象者キャッチアップ

対象:平成9年(1997年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれの女子  
期間:令和7年3月31日まで

## 予防接種の記録(4)

ジフテリア・破傷風	第2期	推奨:11歳~12歳BD前日 無料:11歳(11歳BDの前日)~13歳BD前日
日本脳炎	第2期	推奨:9歳~10歳BD前日 無料:9歳(9歳BDの前日)~13歳BD前日

おたふくかぜ生	1回	推奨:1歳BD前日~2歳BD前日	1回目2回目共に 八王子市民のみ無料 八王子市民以外4,500円
	2回	推奨:年長(小学校就学前の1年間)	
インフルエンザ	6カ月~OK	3歳未満 0.25ml×2 3歳~12歳 0.5ml×2 13歳~ 0.5ml×1	2~4wあける

### その他

不活化ポリオイモバックスポリオ0.5mlシリンジ	年長でMRと共に接種する人が多い	自費8,000円
--------------------------	------------------	----------

### 成人年齢引き下げについて:被接種者が18歳以上の場合

予診票保護者氏名の記入、保護者が同伴しない場合は不要

予診票の保護者記入欄:本人自署

対象:日本脳炎特例接種、子宮頸がん予防のキャッチアップ接種、

麻疹風疹混合特別接種

### 新型コロナウイルスに罹患後のワクチン接種について

隔離療養期間最終日おおむね1か月以降可能

### 新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔について

2週間以上空ける