

予防接種の記録(1)

| | | |
|---|------------------------|--|
| インフルエンザ菌b型 (Hib) アクトヒブ0.5ml シリンジ ※ゴービックへ切り替え× | 1回 | 推奨: 開始(初回)が2カ月～6カ月 2カ月になる日の前日～6カ月(7カ月になる日の前日)に初回=total 4回 (7カ月になる日の当日～1歳BD前日に初回=total 3回) (1歳～5歳BD前日に初回=total 1回) |
| | 2回 | |
| | 3回 | |
| | 追加 | 7か月以上(～13か月まで) ※1歳ごろ |
| 小児肺炎球菌 パクニユバンス0.5ml シリンジ ※プレベナー→パクニユバンスO ※パクニユバンス→プレベナー× | 1回 | 推奨: 生後2カ月～6カ月 2カ月になる日の前日～6カ月(7カ月になる日の前日)に初回=total 4回 (7カ月になる日の当日～1歳BD前日に初回=total 3回) (1歳～2歳BD前日に初回=total 2回) (2歳～5歳BD前日に初回=total 1回) |
| | 2回 | |
| | 3回 | |
| | 追加 | 60日以上あけて ※1歳以降 |
| B型肝炎 ヘプタボックス0.25ml シリンジ | 1回 | 推奨: 2カ月～8カ月 無料: 1歳BDの前日まで 27日以上(4w) ビームゲン0.5ml (10歳以上) ※10歳未満 0.25ml 10歳以上 0.5ml |
| | 2回 | |
| | 3回 | |
| 追加 | 139日以上(20w) ※生後8カ月頃 | |
| 1価ロタリックス 1.5ml 生 | 1回 | 推奨: 生後2M～出生14w6日 無料: 6w0d～24w0d |
| | 2回 | |
| 5価ロタテック 2.0ml | 1回 | 推奨: 生後2M～出生14w6日 無料: 6w0d～32w0d |
| | 2回 | |
| | 3回 | |

予防接種の記録(2)

| | | |
|---|-----|---|
| ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ(4種混合) テトラビック0.5mlシリンジ | | |
| ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ(5種混合) ※ヒブ欄斜線 ゴービック0.5mlシリンジ | | |
| 第1期 初回 | 1回 | 推奨: 2カ月になる日の前日～18カ月 20日以上 無料: ～7歳6ヶ月の前日まで ※五種混合⇄四種混合× ※ゴービック⇄クイントバック 交互接種× 接種機関、シール(BIKEN,kmb)確認 (6ヶ月以上) 標準1年(6ヶ月～1年半)あけて |
| | 2回 | |
| | 3回 | |
| 追加 | 第1期 | |
| 第2期 | 1回 | 推奨: 11歳～12歳BD前日 無料: 11歳(11歳BDの前日)～13歳BD前日 ジフテリア破傷風(二混) ジフテリア破傷風百日咳(三混) ※八王子市民のみ ※二種混合の予診票使用 ※母子手帳は二種混合欄に記載 |
| | 2回 | |
| BCG 生 | 1回 | 推奨: 5～7カ月 トレーにタイマーとアル綿2枚も 無料: 1歳BD前日まで (接種前)ステロイド軟膏注意 接種後完全に乾くまで待機(タイマーセット15分) 接種直後髪や服が当たらないように注意 コッホ現象(経過を用紙を使って) 当日の直射日光× 入浴時こすらない ステロイド2～3か月塗らない |
| 麻疹(はしか) 風疹 生 | 第1期 | 1歳BD前日～2歳BD前日 無料: 特別接種制度あり(20歳BD前日まで) ※接種依頼書(取り寄せ)必要 年長 |
| | 第2期 | |
| 水痘 生 | 1回 | 推奨: 1歳～1歳3か月 無料: 1歳BD前日～3歳BD前日 標準 6ヶ月(3カ月～1年)あけて |
| | 2回 | |

予防接種の記録(3)

| | | 日本脳炎 | |
|---|----------------|-----------------------------------|--|
| 第1期 初回 | 1回 | 推奨: 3歳～4歳BD前日 無料: 1期 6カ月～7歳5カ月 | |
| | 2回 | 6～28日 ジェービックバイアル | |
| 第一期 追加 | 標準1年 | 海外渡航時など | |
| | 推奨: 4歳～5歳前日 | 3歳未満は0.25ml | |
| 第2期 | 推奨: 9歳～10歳BD前日 | 無料: 9歳(9歳BDの前日)～13歳BD前日 | |
| ※特例接種 平成16年4月2日～平成19年4月1日生まれ: 20歳BD前日までの期間に不足分を接種可 | | | |

| シルガード9(9価) | | 筋注: 25G(オレンジ)針 | |
|---------------------------------------|----|--|-----------------------------|
| ヒトパピローマ ウイルス 少なくとも 3か月以上 | 1回 | ①30分待機(タイマー) (標準)2ヶ月以上あけて | 無料: 小6～高1 |
| | 2回 | ②15分待機(タイマー) (標準)6ヶ月以上あけて (6ヶ月後の同一日) | ※シルガード9 2回接種者は 間隔下記参照 |
| | 3回 | ③15分待機(タイマー) | |

※シルガード9(9価) **2回または3回**

ア. 2回の場合(15歳未満のみ実施可能)

1回目を15歳の誕生日前日までに接種することで、2回の接種で完了することができる(被接種者の希望で3回接種も可能)

標準的な接種方法として1回目から6～12カ月の間隔を置いて1回行う

※1回目を「15歳の誕生日当日」に接種した場合は3回接種

イ. 3回の場合

標準的な接種方法として、2カ月の間隔を置いて2回行った後、1回目の接種から6ヶ月の間隔を置いて1回行う

※1年以内に3回の接種を完了することが望ましい

※2回目及び3回目の接種が初回接種の2か月後及び6か月後にできない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも**1か月以上**、3回目接種は2回目接種から少なくとも**3か月以上**間隔を置いて実施すること

予防接種の記録(4)

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|--|
| おたふくかぜ 生 第一三共 バイアル | 1回 | 推奨: 1歳BD前日～2歳BD前日 | 1回目2回目共に 八王子市民のみ無料 八王子市民以外4,500円 |
| | 2回 | 推奨: 年長(小学校就学前の1年間) | |
| インフルエンザ | 6カ月～OK | | |
| | 3歳未満 | 0.25ml × 2 | 2～4wあける |
| | 3歳～12歳 | 0.5ml × 2 | |
| 13歳～ | 0.5ml × 1 | | |

その他

| | | |
|---|------------------|----------|
| 不活化ポリオ イモバックスポリオ 0.5mlシリンジ (針付き) | 年長でMRと共に接種する人が多い | 自費8,000円 |
|---|------------------|----------|

成人年齢引き下げについて

被接種者が16歳以上の場合

予診票保護者氏名の記入、保護者の同伴、保護者が同伴しない場合の同意書: 不要

予診票の保護者記入欄: 本人自署

対象: 日本脳炎特例接種、子宮頸がん予防のキャッチアップ接種、麻疹風疹混合特別接種

新型コロナウイルスに罹患後のワクチン接種について

隔離療養期間最終日のおおむね1か月以降可能

新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔の制限はなくなりました

子宮頸がん予防ワクチンの定期接種対象者キャッチアップ

対象: 平成9年(1997年)4月2日～平成20年(2008年)4月1日生まれの女子

期間: 令和7年3月31日まで